28 DE ANI
National
Cotidian fondat în 1997



# Studiu devastator: vaccinul Covid a distrus imunitatea. Creștere explozivă a infecțiilor respiratorii

Autor: **Claudia Marcu**

**Rezultatele celui mai amplu studiu, efectuat pe 51,6 milioane de persoane, au arătat că vaccinul Covid  a provocat un sindrom de imunodeficiență, înregistrându-se creșteri explozive ale infecțiilor respiratorii, dar și ale pneumoniilor și tuberculozei. Cei mai afectați au fost copiii și adolescenții cu vârste de până la 19 ani, urmați de persoanele cu vârste de peste 65 de ani. Procentele infecțiilor au crescut odată că numărul dozelor de vaccin administrate, potrivit autorilor studiului.**

Concluziile unui studiu al cercetătorilor din Coreea de Sud asupra vaccinărilor Covid, care a acoperit întreaga populație din această țară, de 51,6 milioane de oameni, publicat în Jurnalul Internațional de Boli Infecțioase și preluat de sante-nutrition.org, au sugerat apariția sindromului imunodeficienței dobândite prin vaccin (VAIDS). Rezultatele au arătat o creștere explozivă a infecțiilor respiratorii după vaccinare, odată cu majorarea numărului de doze, dar și a pneumoniilor și tuberculozei. În studiul cercetătorilor coreeni, vaccinați Covid au fost considerați cei cărora le-au fost administrate cel puțin două doze,

vaccinații cu o singură doză fiind considerați nevaccinați, astfel că riscul real asociat cu vaccinurile este probabil mult mai mare decât cifrele raportate.

## Copiii și adolescenții, cei mai afectați

Cercetările au arătat că, la copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani, riscul de infecție virală a căilor respiratorii superioare (răceală comună) crește cu 299% după a doua doză de vaccin Covid, cu 391% după a treia doză și cu 559% după a patra doză sau ulterioare. La persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste, riscul crește cu 9% după a doua doză, cu 33% după a treia doză și cu 58% după a patra doză sau după dozele ulterioare. În ce privește riscul de infecții ale tractului respirator superior, la vârste cuprinse între 0 și 19 ani, acesta a crescut cu 62% după a doua doză, cu 67% după a treia doză și cu 83% după a patra doză. La persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste riscul a crescut cu 57% după patru sau mai multe doze, se arată în studiu.

## Creștere accelerată a pneumoniilor

În ceea ce privește tuberculoza, în timp ce populația generală nu a prezentat nicio modificare semnificativă, subgrupul de persoane Covid-pozitive a prezentat o tendință ascendentă clară odată cu creșterea dozelor: +24% după două doze și +35% după patru sau mai multe doze. ”Acest lucru sugerează o creștere măsurabilă a tuberculozei post-infecție sau reactivare la persoanele infectate anterior cu SARS-CoV-2 care au primit doze multiple de rapel”, notează sante-nutrition.org. În ceea ce privește pneumonia, la participanții care nu contractaseră niciodată Covid-19, incidența a crescut constant odată cu numărul de doze suplimentare: +34% după a doua doză și +91% după patru sau mai multe doze, au arătat cercetătorii.

## Dereglare a imunității

Modelul de creștere a infecțiilor respiratorii, dar și a pneumoniilor și tuberculozei, odată cu numărul de doze de vaccin Covid administrate, reprezintă un semnal serios pentru populație, sugerând un sindrom de imunodeficiență dobândită prin vaccinare, potrivit sante-nutrition.org. Clinic, o astfel de disreglare imună se poate manifesta ca o incidență crescută a infecțiilor tractului respirator superior și a răcelii comune, corelată în mod clar cu vaccinarea repetată cu ARNm. ”Semnalele preliminare indică epuizarea imună, dominanța IgG4 și imunodeficiența secundară, în concordanță cu creșterea observată a infecțiilor cronice și vulnerabilitatea dependentă de doză la bolile respiratorii comune”, susțin autorii studiului.